

PERMANENTNÍ MAKE-UP SE NEPROVÁDÍ PŘI

Těhotenství a kojení: Z důvodu možných komplikací a hormonálních změn se doporučuje počkat s aplikací permanentního make-upu.

Alergie na pigmenty nebo anestetika: Pokud má klient alergii na pigmenty nebo lokální anestetika, procedura není vhodná.

Kožní problémy v oblasti aplikace: Například při akné, ekzémech, dermatitidě nebo oparových infekcích v místě, kde by se permanentní make-up prováděl.

Autoimunitní onemocnění: U lidí s některými autoimunitními nemocemi může být hojení komplikovanější a výsledek neuspokojivý.

Cukrovka: U diabetiků může být horší schopnost hojení a vyšší riziko infekce.

Poruchy srážlivosti krve: U lidí s poruchami srážlivosti nebo užívajícími léky na ředění krve (antikoagulancia) je větší riziko krvácení a zhoršeného hojení.

Onkologická léčba: Během chemoterapie nebo radioterapie je tělo oslabeno, proto se doporučuje počkat až po dokončení léčby a zotavení.

Akutní infekce nebo horečnaté stavy: Jakákoli infekce nebo horečka je důvodem k odložení zákroku.

Epilepsie: U osob s nekontrolovanou epilepsií je riziko záchvatu během zákroku.

Užívání antibiotik nebo kortikosteroidů: Při užívání některých léků je lepší počkat, dokud se tělo nevrátí do normálního stavu.

Tyto kontraindikace je důležité probrat během konzultace s odborníkem před samotným zákrokem.

ESTUDIO DE BARBARA